

PROSTATA

Schema di Supporto Nutraceutico

Ipertrofia Prostatica benigna

Prostamed Plex

Si consigliano 1 o 2 cp. al dì, secondo situazione clinica (valori PSA, ecografia, valutazione urologica) - con situazione clinica stabilizzata continuare sempre con 1 cps al giorno

prevenzione : 1 cps al dì

Curcumed Plex

2 capsule al dì, secondo indicazioni – con situazione clinica stabilizzata continuare sempre con 1 cps al giorno

Questi 2 prodotti possono essere assunti tranquillamente insieme

Alphaguard 1 cps. al dì, assunta al mattino

OptiZinc 1 cps. al dì, assunta al mattino

Per il supporto epatico può essere molto utile assumere anche :

HEP 194 1 cps al dì, dopo pranzo

Carcinoma della Prostata

Prostamed Plex

2 o 3 cps. al dì, secondo situazione clinica (valori PSA, ecografia, ecc.)

Curcumed Plex

Assumere da 2 a 4 capsule al dì, secondo indicazioni cliniche – anche in fase di remissione è consigliabile assumere comunque 2 cps al dì

BioBran (Arabinoxylan)

1 o 2 bustine da 1000 mg al dì, secondo indicazioni cliniche, da assumersi in prossimità dei pasti.

Nella fase attiva della malattia si consigliano 2 bustine al dì, in fase remissiva consolidata continuare con 1 bustina (1 g) o con 4 cps da 250 mg

Alphaguard

1 cps. x 2 al dì, assunta al mattino e al pomeriggio, in modo continuativo